

taltz[®]
(ixékizumab)
injectable

Manuel d'utilisation de la seringue pré-remplie **TALTZ**[®]



Taltz[®] 80 mg
solution injectable
en seringue pré-remplie
ixékizumab

Lilly

► Informations importantes sur la seringue pré-replie Taltz[®]




- Avant d'utiliser la seringue pré-replie Taltz[®], lisez et suivez attentivement les instructions étape par étape. Conservez ce manuel d'utilisation et consultez-le en cas de besoin.
- La seringue pré-replie contient 1 dose de Taltz[®].
- La seringue pré-replie est à **USAGE UNIQUE EXCLUSIVEMENT**.
- La seringue ne doit pas être secouée.
- Votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère pourra vous aider à choisir la partie du corps où injecter votre dose.
- Lisez la notice à l'intérieur de la boîte de Taltz[®] pour avoir plus d'informations sur ce médicament.

Instructions d'utilisation



Avant d'utiliser la seringue pré-replie Taltz[®], lisez et suivez attentivement les instructions étape par étape.

► Légende des différents éléments de la seringue



1a) Sortez la seringue pré-remplie du réfrigérateur

Laissez le capuchon de l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection. **Attendez 30 minutes** pour laisser la seringue se réchauffer à température ambiante avant de l'utiliser.

N'UTILISEZ PAS de sources de chaleur telles qu'un micro-ondes, de l'eau chaude ou la lumière directe du soleil, pour réchauffer le médicament.

1b) Rassemblez les éléments nécessaires à l'injection

- 1 compresse imbibée d'alcool
- 1 morceau de coton ou de gaze
- 1 collecteur pour objets piquants ou coupants pour y éliminer les seringues

1c) Examinez la seringue pré-remplie

- Vérifiez l'étiquette. Assurez-vous que le nom Taltz[®] figure sur l'étiquette.
- Le médicament à l'intérieur de la seringue doit être limpide. Sa couleur peut varier d'incolore à légèrement jaune.
- Vérifiez que la partie extérieure de la seringue pré-remplie n'est pas abîmée. Laissez le capuchon de l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.



! Dans les cas suivants, n'utilisez pas la seringue et éliminez-la selon les recommandations :


- la date de péremption est dépassée,
- la seringue semble abîmée,
- le médicament est trouble, de couleur marron ou contient de petites particules.

1d) Lavez-vous les mains avant de procéder à l'injection du médicament.

1e) Choisissez le site d'injection

Vous pouvez effectuer l'injection :

- dans le ventre (abdomen),
- la cuisse, ou
- l'arrière du bras. Pour l'injection dans le bras, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider.



N'injectez pas le produit :


- dans des zones où la peau est sensible, présente des hématomes, est rouge ou dure, présente des cicatrices ou des vergetures,
- à moins de 2,5 cm autour du nombril,
- à chaque fois au même endroit.

Alternez les sites d'injection : par exemple, si la dernière injection a été effectuée dans la cuisse gauche, vous pouvez faire l'injection suivante dans la cuisse droite, le ventre ou à l'arrière de l'un des deux bras.

1f) Préparez votre peau


Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool.

Laissez sécher naturellement le site d'injection avant de procéder à l'injection.




Retirez le capuchon de l'aiguille et jetez-le.

- **NE REMETTEZ PAS** le capuchon sur l'aiguille ; vous risqueriez d'abîmer l'aiguille, ou de vous blesser accidentellement.
- **NE TOUCHEZ PAS** l'aiguille.



Pincez doucement la peau et maintenez un pli de peau dans lequel l'injection sera effectuée.



Insérez l'aiguille en l'inclinant de 45 degrés.

- Laissez-la aller doucement dans votre peau.
- Maintenez bien l'aiguille en place.

Poussez sur le piston.

- Poussez lentement sur le piston jusqu'à ce que la totalité du médicament ait été injectée.
- Le piston gris de la seringue doit être poussé jusqu'au fond de la seringue.
- Retirez doucement l'aiguille de votre peau.
- Appuyez avec un morceau de coton ou de gaze sur le site d'injection.
- **NE FROTTEZ PAS** le site d'injection pour ne pas provoquer d'ecchymoses. Il peut y avoir un léger saignement. C'est normal.

Vous devez voir la tige verte du piston dans le corps de la seringue lorsque l'injection est terminée.



3a **Éliminez la seringue pré-remplie utilisée**

NE REMETTEZ PAS le capuchon sur l'aiguille. Éliminez la seringue dans un collecteur pour objets piquants ou coupants ou selon les recommandations de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère.

- Ne recyclez pas le collecteur pour objets piquants ou coupants quand il est plein.
- Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère comment éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.



① Qu'est-ce que les DASRI ?

Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets ! En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec. On appelle ainsi DASRI les Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux. Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d'infection. Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit les seringues et aiguilles usagées. **En aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et éliminés avec les ordures ménagères.** Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être éliminés à la poubelle.

② Comment se procurer ces boîtes à aiguilles ?

Ces boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies, sur présentation de votre ordonnance.

③ Comment utiliser les boîtes à aiguilles ?

- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

④ Où faut-il rapporter les boîtes à aiguilles ?

Rapportez la boîte à aiguille fermée à un point de collecte. Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie, sur le site internet <http://nous-collectons.dastri.fr>.





Afin de vous accompagner dans l'utilisation de cette seringue,
nous vous proposons de redécouvrir ces différentes étapes en vidéo :



POUR Y ACCÉDER :

<https://www.lilly.fr/nos-medicaments/liste-medicaments/taltz-lilly/video-d-utilisation-seringue>

ou



Téléchargez
une application QR code
et flashez le code

iOS



ANDROID



CONSEILS DE SÉCURITÉ



- Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour utiliser la seringue pré-remplie, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Si vous avez des problèmes de vue, **n'utilisez pas** la seringue pré-remplie sans l'aide d'une personne formée à son utilisation.
- **Ne partagez pas et ne réutilisez pas** la seringue Taltz® pré-remplie. Vous risqueriez de transmettre ou de contracter une infection.
- Tenez la seringue hors de la vue et de la portée des enfants.
- Si vous n'avez pas de collecteur pour objets piquants ou coupants, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère où vous pouvez vous en procurer un.



► **Que dois-je faire si je vois des petites bulles d'air dans seringue pré-remplie ?**

Il est normal que la seringue contienne parfois des petites bulles d'air. Taltz[®] est injecté sous votre peau (injection sous-cutanée). La présence de petites bulles d'air ne pose pas de problème pour ce type d'injection. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur la dose.

► **Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la seringue pré-remplie ?**

La présence d'une goutte de liquide au bout de l'aiguille est normale. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur la dose.

► **Que faire si je n'arrive pas à pousser sur le piston ?**

Si le piston est coincé ou abîmé :

- **Arrêtez** d'utiliser la seringue
- Retirez l'aiguille de votre peau.

QUESTIONS

► Comment savoir si l'injection avec la seringue pré-remplie est terminée ?

Lorsque l'injection est terminée :


- La tige verte du piston doit être visible dans le corps de la seringue
- Le piston gris de la seringue doit être poussé au maximum jusqu'au fond de la seringue.


► Que faire si la seringue pré-remplie est laissée à température ambiante pendant plus de 30 minutes ?

Si nécessaire, la seringue pré-remplie peut être laissée en dehors du réfrigérateur jusqu'à 5 jours à une température ne dépassant pas 30 °C si elle est conservée à l'abri de la lumière directe du soleil. Taltz® doit être éliminé s'il n'est pas utilisé pendant la période de 5 jours à température ambiante.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

i





taltz[®]
(ixékizumab)
injectable



Pour toute demande d'information concernant nos produits ou services, vous pouvez contacter le service d'information médicale et pharmacovigilance de Lilly au :

0 800 00 36 36 Service & appel gratuits

ou tel : 01.55.49.32.51

fax : 01.55.49.33.07

www.lilly.fr

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez ou via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Lilly France

24 boulevard Vital Bouhot – CS 50004 – 92521 Neuilly sur Seine Cedex (FRANCE)

Tél. : 01 55 49 34 34 – Fax : 01 41 44 02 47 - www.lilly.fr – Société par

Actions Simplifiée – R.C.S. Nanterre B 609 849 153. Information Médicale

et Pharmacovigilance : **0 800 00 36 36** Service & appel gratuits

ou tél. : 01.55.49.32.51. - fax : 01.55.49.33.07



LE TRI
+ FACILE

